

罗氏P/D模块条形码专用包装

适用于罗氏Modular P/D封闭通道

编号	项目	中文名称	方法学	规格R1	规格R2	数量	单位	备注
ADH357	ALB	白蛋白	溴甲酚绿PLUS	6x64ml	6x16ml	480	ml	{ G }
ADH293	ALP	碱性磷酸酶	AMP	5x50ml	5x10ml	300	ml	{ G }
ADH168	ALT	丙氨酸氨基转移酶	IFCC	6x66ml	6x16.5ml	495	ml	{ G }
AD1007AM	AMM	血氨	酶法	5x50ml	5x10ml	300	ml	
ADH193	AMY	淀粉酶	IFCC	6x66ml	6x16ml	492	ml	{ G }
ADH609	APO A1	载脂蛋白A1	免疫比浊	6x19ml	6x5ml	144	ml	
ADH809	APO B	载脂蛋白B	免疫比浊	6x19ml	6x5ml	144	ml	
ADH418	ASO	抗溶血素O	免疫比浊LATEX	6x22ml	6x22ml	264	ml	
ADH167	AST	门冬氨酸氨基转移酶	IFCC	6x66ml	6x16.5ml	495	ml	{ G }
ADH807	C3	补体C3	免疫比浊	2x18ml	2x4ml	44	ml	{ S }
ADH808	C4	补体C4	免疫比浊	2x18ml	2x4ml	44	ml	{ S }
ADH162	CA	钙	CPC	6x63ml	6x29ml	552	ml	{ G }
ADH145	CHOL	总胆固醇	GPO-PAP	12x65ml		780	ml	{ G }
AUD1011	CHE	胆碱酯酶	丁酰硫代胆碱	9x62ml	9x15.5ml	697.5	ml	{ G }
ADH149	CK NAC	肌酸激酶	DGKC	4x60ml	4x15ml	300	ml	{ G }
ADH406	CK-MB	肌酸激酶同工酶	免疫抑制	6x21ml	2x14.6ml	155.2	ml	
ADH416	CK-MB	肌酸激酶同工酶	免疫抑制	4x60ml	4x15ml	300	ml	
ADH1101	CO2	二氧化碳	酶法	6x20ml		120	ml	
ADH236	CREA	肌酐	苦味酸	9x66ml	9x16.5ml	742.5	ml	{ G }
ADH266	CREA	肌酐	酶法	6x70ml	6x35ml	630	ml	{ G }
ADH324	CRP	C反应蛋白	免疫比浊LATEX	6x20ml	6x10ml	180	ml	
ADH304	CRP HS	超敏C反应蛋白	免疫比浊LATEX	6x16ml	6x16ml	192	ml	
AHD1103	CYS C	胱抑素C	免疫比浊LATEX	2x60ml	2x15ml	150	ml	
ADH265	DBIL	直接胆红素	DPD	5x17ml	5x5.5ml	112.5	ml	{ G }
ADH205	DBIL	直接胆红素	DPD	5x50ml	5x12ml	310	ml	{ G }
ADH1012	FRUC	糖化血清蛋白	NBT	15x20ml		300	ml	
ADH274	GGT	γ谷氨酰转肽酶	CARBOXY	6x66ml	6x16ml	492	ml	{ G }
ADH268	GLU	葡萄糖	己糖激酶	9x66ml	9x16.5ml	742.5	ml	{ G }
ADH278	GLU	葡萄糖	氧化酶法	12x66.5ml		798	ml	{ G }
ADH212	HBDH	α羟丁酸脱氢酶	DGKC	9x19.5ml	9x5ml	220.5	ml	{ G }
ADH222	HBDH	α羟丁酸脱氢酶	DGKC	9x66ml	9x16.5ml	742.5	ml	{ G }
ADH652	HDL-C	高密度脂蛋白胆固醇	直接法	6x60ml	6x20ml	480	ml	
AUD1005	HCY	同型半胱氨酸	酶法	1x25ml	1x7ml	32	ml	
ADH616	IgA	免疫球蛋白A	免疫比浊	6x53ml	6x20ml	438	ml	{ S }
ADH627	IgG	免疫球蛋白G	免疫比浊	6x53ml	6x20ml	438	ml	{ S }
ADH618	IgM	免疫球蛋白M	免疫比浊	6x53ml	6x20ml	438	ml	{ S }
ADH331	IRON	铁	亚铁嗉法	9x65ml	9x16ml	729	ml	{ G }
ADH221	LDH	乳酸脱氢酶	DGKC	9x66ml	9x16.5ml	742.5	ml	{ G }
ADH221L	LDH	乳酸脱氢酶	L-P	9x66ml	9x16.5ml	742.5	ml	{ G }

编号	项目	中文名称	方法学	规格R1	规格R2	数量 单位	备注
ADH635	LDL-C	低密度脂蛋白胆固醇	直接法	6x60ml	6x20ml	480 ml	
ADH537	LIPASE	脂肪酶	比色法	3x38ml	3x20ml	174 ml	{ G }
AD419LP	LP(a)	脂蛋白 (a)	免疫比浊	5x50ml	5x10ml	300 ml	
ADH501	MALB	微量白蛋白	免疫比浊	8x20ml	4x8.7ml	194.8 ml	
ADH287	Mg	镁	二甲苯胺蓝	6x58ml	6x59ml	702 ml	{ G }
ADH239	P	无机磷	U.V.	9x41ml	9x19.5ml	544.5 ml	{ G }
ADH106	PALB	前白蛋白	免疫比浊	2x15ml	2x6ml	42 ml	{ S }
ADH518	RF	类风湿因子	免疫比浊LATEX	6x56ml	6x20ml	456 ml	
ADH255	TBIL	总胆红素	DPD	9x62ml	9x15.5ml	697.5 ml	{ G }
ADH325	TF	转铁蛋白	免疫比浊	6x20ml	6x7ml	162 ml	{ S }
ADH174	TG	甘油三酯	GPO氧化酶法	12x65ml		780 ml	{ G }
ADH346	TP	总蛋白	双缩脲	6x65.5ml	6x65.5ml	786 ml	{ G }
ADH313	UP	脑脊液/尿总蛋白	苝甲乙氧铵	3x40ml	3x16ml	168 ml	
ADH171	UREA	尿素	U.V.	6x66ml	6x43ml	654 ml	{ G }
ADH176	UA	尿酸	URICASE Plus	6x66ml	6x16ml	492 ml	{ G }

{ G } 推荐选用欧迪诊断通用化学标准品AD983定标。

{ S } 推荐选用欧迪诊断特种蛋白标准品AD9605定标。